

Das Mainzer Stadienmodell der Schmerz-Chronifizierung (MPSS)

Auswertungsformular

Achse 1: Zeitliche Aspekte	Wert	Achsen- summe	Achsen- stadium						
Auftretenshäufigkeit • einmal täglich oder seltener • mehrmals täglich • dauernd	1 2 3	3 = I 4-6 = II 7-9 = III							
Dauer • bis zu mehreren Stunden • mehrere Tage • länger als eine Woche oder dauernd	1 2 3								
Intensitätswechsel • häufig • gelegentlich • nie	1 2 3								
Achse 2: Räumliche Aspekte									
Schmerzbild • monolokulär • bilokulär • multilokulär oder Panalgesie	1 2 3	1 = I 2 = II 3 = III							
Achse 3: Medikamenteneinnahmeverhalten									
Medikamenteneinnahme • unregelmäßiger Gebrauch von max. 2 peripheren Analgetika • max. 3 periphere Analgetika, höchstens 2 regelmäßig • regelmäßig mehr als 2 periphere Analgetika oder zentralwirkende Analgetika	1 2 3	2 = I 3-4 = II 5-6 = III							
Anzahl der Entzugsbehandlungen • keine • eine • mehr als eine Entzugsbehandlung	1 2 3								
Achse 4: Patientenkarriere									
Wechsel des persönlichen Arztes • kein Wechsel • max 3 Wechsel • mehr als 3 Wechsel	1 2 3	4 = I 5-8 = II 9-12 = III							
Schmerzbedingte Krankenhausaufenthalte • bis 1 • 2 bis 3 • mehr als 3	1 2 3								
Schmerzbedingte Operationen • bis 1 • 2 bis 3 • mehr als 3	1 2 3								
Schmerzbedingte Rehabilitationsmaßnahmen • keine • bis 2 • mehr als 2	1 2 3								
<table> <tr> <td> Addition der Achsen-Stadien </td> <td> Gesamt-Stadium </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> I 4-6 II 7-8 III 9-12 </td> <td></td> </tr> </table>				Addition der Achsen-Stadien	Gesamt-Stadium			I 4-6 II 7-8 III 9-12	
Addition der Achsen-Stadien	Gesamt-Stadium								
I 4-6 II 7-8 III 9-12									